


โรคพิษสุนัขบ้า

เกิดจากเชื้อไวรัส รูปร่างคล้ายกระสุนปืน ถูกทำลายได้ง่าย เมื่อถูกความร้อน ความแห้ง แสงแดด ยาฆ่าเชื้อพวก คลอรีน แอลกอฮอล์ กรด หรือ ต่าง อย่างแรง เกิดในสัตว์เลือดอุ่น เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง ชะนี กระรอก กระแต เสือ หมี หนู ค้างคาว รวมทั้งคน แต่ในประเทศไทยพบมากที่สุดที่สุนัข (๙๖% ของ จำนวนที่พบเชื่อจากการวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ) รองลงมา คือ แมว



การติดต่อ โดยถูกสัตว์ที่เป็นโรค กัด ข่วน เลีย น้ำลาย กระเด็นเข้าทางตา ปาก หรือทางผิวหนังที่มีบาดแผล

ระยะฟักตัวในสุนัข ๗ วัน ถึง ๖ เดือน ขึ้นกับบริเวณที่ได้รับเชื้อ ความรุนแรงของเชื้อ โดยเฉลี่ยประมาณ ๒-๖ สัปดาห์

อาการในสุนัข มี ๒ ชนิด คือ ชนิดซึม และ ชนิดดุร้าย



จะทำอย่างไรเมื่อถูกสัตว์กัด



๑. ล้างแผล

ล้างแผลด้วยสบู่กับน้ำ หลายๆ ครั้ง เพื่อล้างเชื้อ ออกจากบาดแผลถ้ามี เลือดออกควรปล่อยให้เลือดไหลออก อย่าบีบหรือเค้น แผล เพราะจะทำให้เชื้อแพร่กระจายไปส่วนอื่น



๒. ใส่ยา

ใส่ยาใส่แผล เช่น เบตาดีน ทิงเจอร์ไอโอดีน แอลกอฮอล์ ๗๐ %

จะช่วยฆ่าเชื้อโรค อย่าใส่สิ่งอื่น เช่น เกลือ ยาฉุน ลงใน แผล ไม่ควรเย็บแผล ถ้าจำเป็นควรรอไว้ ๓-๔ วัน ถ้า เลือดออกมากหรือแผลใหญ่อาจเย็บหลวม ๆ และใส่ท่อระบายไว้



๓. กักหมา

กักสัตว์ที่กัดไว้ดูอาการอย่างน้อย ๑๕ วัน โดยให้น้ำและ อาหารตามปกติ

อย่าฆ่าสัตว์ให้ตายทันที เว้นแต่สัตว์นั้นดุร้ายกัดคนหรือสัตว์อื่นหรือไม่สามารถกักสัตว์ไว้ได้ ถ้าสัตว์หนีหายไปให้ถือว่า สัตว์นั้นเป็นโรคพิษสุนัขบ้า



๔. หามหมอ

รีบไปหาแพทย์หรือสัตวแพทย์ทันทีที่ถูกกัด เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนและซีรัมยารองจนสัตว์ ที่กัดตาย เมื่อสัตว์ตายรีบตัดหัวส่งตรวจโรคพิษสุนัขบ้า

จะส่งซากสัตว์วินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างไร

เมื่อสงสัยว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ควรกักขังสัตว์ไว้ในที่ปลอดภัย และเฝ้าดูอาการประมาณ ๑๕ วัน ไม่ควร ทำลายสัตว์โดยไม่จำเป็น ควรปล่อยให้สัตว์ตายเอง ซึ่งจะ ตรวจพบเชื้อได้ง่าย และแน่นอน ในการส่งซากควรส่งให้เร็วที่สุดโดยปฏิบัติตามอย่างระมัดระวัง เรื่องความสะอาดและระลึกไว้เสมอว่า สัตว์อาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ จึงควรสวมถุงมือ ขณะเก็บซาก และล้างมือให้สะอาดหลังจากเก็บซาก ควรส่ง เฉพาะส่วนหัว



๑. ตัดหัวสัตว์

ตัดหัวสัตว์ตรงคอต่อ ใส่ถุงพลาสติกซ้อน หลาย ๆ ชั้น รัดปากถุงให้แน่น ใส่ถุงมือทุกครั้งที่ตัดหัวสัตว์ ถ้าเป็นแมวหรือสัตว์ตัว เล็กสามารถส่งได้ทั้งตัว



๒. แช่แข็ง

ใส่กระติกหรือภาชนะอย่างอื่น เช่น กล่อง โฟม แล้วใส่น้ำแข็งให้เย็นตลอดเวลา แล้ว ใส่น้ำแข็งให้เย็นตลอดเวลา



๓. ประวัติน

ส่งพร้อมประวัติสัตว์ ชนิด เพศ อายุ สี อาการป่วย ชื่อ ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ เจ้าของสัตว์ และผู้ถูกกัด

ในกรณีส่งซากควรส่งให้เร็วที่สุด ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หรือ ติดต่อกำหนดงานปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ

จะป้องกันสุนัขบ้าได้อย่างไร



๑. ไม่ปล่อยสุนัขพเนจร

สุนัขจรจัดที่อยู่ข้างถนนเป็นตัวแพร่เชื้อโรคที่สำคัญ อาจกัดคนที่เดินผ่านไปมาหรือกัดสุนัขอื่นทำให้เป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้



๒. ฉีดวัคซีนป้องกันทุกปีสุนัข

จรรยาบรรณของเจ้าของสัตว์ (ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า ๒๕๓๕) ที่จะต้องนำสุนัขอายุระหว่าง ๒-๔ เดือน ไปรับการฉีดวัคซีน

๓. อย่าให้มีลูกมาก

โดยการทำหมันสุนัขทั้งตัวผู้และตัวเมียหรือฉีดยาคุมกำเนิดสุนัขตัวเมีย ไม่ให้มีลูกมากเกินไปจนไม่อาจเลี้ยงดูได้ต้องนำไปปล่อยกลายเป็นสุนัขจรจัดและเป็นปัญหาของสังคม



เรื่อนน่ารู้.....

- ☒ สุนัขตัวผู้เป็นโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าตัวเมีย
- ☒ สุนัขแสดงอาการบ้าแบบดุร้ายมากกว่าแบบซึม
- ☒ กว่า ๙๐ % ของผู้ที่ตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากการไม่ไปพบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีนหลังจากถูกสัตว์กัด
- ☒ ผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าส่วนใหญ่ เนื่องมาจากการถูกกัดโดยสุนัขจรจัด หรือสุนัขที่มีเจ้าของแต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- ☒ สุนัขอายุน้อยเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าอายุมาก
- ☒ ผู้ชายตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าผู้หญิง
- ☒ การช่วยเหลือสุนัขจรจัดโดยการหาอาหาร แต่ไม่นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิด ไม่ให้มีลูก เป็นการเพิ่มจำนวนสุนัขจรจัดและแพร่กระจายโรคพิษสุนัขบ้า
- ☒ ลูกสุนัข (ทุกอายุ) มีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้เช่นเดียวกับสุนัขโต



โรคพิษสุนัขบ้า



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4475 6601
www.muangnat.go.th

เอกสารเผยแพร่

แจ้งสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีที่พบเห็นสุนัขหรือสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า